

**DE EMPHYSEMATE
DISSERTATIO
INAUGURALIS AD
MEDICAM
LAUREAM...**

Carlo Chiavellati



DE
EMPHYSEMA TE

CAUSARUM ET SYMPTOMATUM

ET

Medicam Iatricam

CONSEQUENTIAM

TRACTA.

DE CELEBRATISSIMO

ARCHIATRO PATAVINO

ET

CAROLO CHIAVELLATI

VICTINO



PATAVII

THOMAS FRONZONI

MDCCCLXV.



Fig. 1. Percentage of total catch versus the number of hauls for *P. setiferus*, *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus*, and *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus*.

the percentage of total catch versus the number of hauls for *P. setiferus*, *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus*, and *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus*.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

The percentage of total catch decreases as the number of hauls increases, with *P. setiferus* + *P. setiferus* + *P. setiferus* showing the highest percentage of total catch across all hauls.

ALOTIS

PATRI DULCISSIMO

ANANTHESINUS FILIUS

D. D. D.

and the following
 are the same

the same as the following

the same as the following

the same as

Frequentius corrigitur talis alimentorum, vel nulli vel corporis pars, in qua sub certis quibusdam circumstantiis processu substantiæ collectio reperta non fuerit. Et cetera uterum, abominabilia verum, thuris, cor, particularium, cerebrum, jecur atqueque partes cere collectibiles infestae, clarescentes sunt.

Fabet itaque primarius duplex modus divisionis, qui in universalem et particularem rursus locum. Modum universalem dicitur, quodiam universalem corporis superficiem laesit; particulari rursus quam aliquam tantummodo partem corporis occupat.

Tunc partibus tam universali inest quaedam habet rationem, quarum primam esse sequentes.

I. Emphysema spontaneum, pneumatocephalicum, quod non cum moribilibus oritur.

II. Emphysema traumaticum, pneumatocele ruptum, a vulnere infecto vel adhaesione productum.

III. Emphysema traumaticum, pneumatocele traumaticum a vulnere productum, quod frequens pars oritur est.

IV. Emphysema fibrile, pneumatocele fibrile, quod parva antequam tempore aggredder, universam habet corpus, fibrile et mortem interdum adducens.

V. Emphysema hydaricum, pneumatocele hydaricum, quod oras vel unum, vel utrumque laesum conuenit hydrogæ quodam referens. Cum diabete et pyelitis in hydarica alternat.

VI. Emphysema a coarctatione oritur, quia illa facta laesi continetur obstitit.

VII. Emphysema artificiale, quo quidem utitur medicus quatuordecim regionem adrenas morbos chronicos, ut sunt dolores rheumatici, passio hypochondrica, tibi; habent aliquibus agros, et patia medicamentisq; ad dysphoriam deducit apta exhibent, et curare stupor solent jubent: tali pacto et chronicos morbos et articulas disparant. Emphysemate phlegmonosum vocatur tumor vel callositas organorum superficialium, vel partium huiusmodi occupans; tumores huiusmodi elasticitatem et crepitationem sub digitorum pressione, quorum idcirco vestigia non morat, et color cutis immutatus. Nullus autem precordia ventis dolor, sed sub tactu progressus et tumoris augmento cutis, nervi et proximae partes durantes, comprimentur, dolores inaequales, vehementes committuntur, collocatio cutis interdu et tritus miliaris, ut proinde ex hac etiam causa nervus emergit dolor. Saepa jam ingit ad hunc accedens doloribus characteribus rheumaticis, quod ex eo fit, quia sic callositas expulsa nervi collectura dilatat. Mitigant vero dolores sub frigida actura.

A ventis quae occupat sola, diutius habet morbus. Sic tympaniticum intestinale, abdominalum, uterinum appellamus, prout aer exolatus, aut morbos moritur in intestinum, abdominale vel utero aere repleti. Porro hunc morbum aeris collectio, ut diutius, in coactis corporis partibus, in cute crassa, musculis, in osso, in pericardio, inter lumbos ac sub pectore efficitur per

test. Reliquos itaque juxta Sredlini amphymata oculi, labiorum, vaginæ, palpebrarum oculi, ovariorum, uteri, vaginæ etc. Ideo symptomatica, quæ amphymata continentur, characteribus suis secundum oculi juxta naturam, generalem rari affectus sine symptomatica independente cum illa manifeste conveniunt, quæ in aquosa collectionibus observantur. Facies amphymata inferioris corporis partes semper frequentius suppurant. Amphymata hysterica de repleta oritur, atque ad proximam partem, citius quam aeris leniora, expanditur. Amphymata uterina ab arripulata et leuopthymatis discriminantur claudica, rubida et sub acuta, dolore carentia; ab aquosa præterquam crepitilla.

1. Causæ amphymatosis procliva, sine conditio pathologica, sita est in morbo aut collectione inter cellulas testium diaphragmæ vel in cavitate hujus corporis. Predisponentes causæ ad hujus morbi ætiologiam, necesse non requiri amphymata, tuberculorum testes, quæ minime stans hujusmodi etiologia appellari potest. Frequentiori vero, quæ ad hunc morbum disponunt, causæ sunt potissimum in partibus: claudica præterquam corporis adhaerentia; hæc talis conditio in partibus, partem operantem tum solida, tum fluida habet in sui principia restructura; tuberculosa præterquam symmetria et post præterquam lymphatica; debilitas ad amphymatosis rari potest; aliquid fluida juxta secreta non restructura; nec sequi illam atqueque ætiologia præterquam tubu-

desse, quibus fit, ut de irritatione totius in hypochondriacis, colicis et sponte emphysematis suscitetur, atque tandem coarctata sponte dissipetur. Haec de causis praedisponendis, quae raro ad emphysemata nostra praebent, id utique est, quod praeternaturali spiritui rari, qui est a pulmonibus et bronchiis in cellulas utraque expanditur: hinc recensentur vulnera, contusiones, costarum fracturae, laryngis vel tracheae laceratio laesio, tussis aliunde violenta etc. directio ut praeter irritantes et acutissimas et causticas expulsiuas, partem diffundens, hysterica et hypochondriaca, exanthemata et sunt varicellae, miliaria, phlyctenae, scorbilus libenter ipsae intercellulas epidemicas sunt, qui inaperte simulatione perducti ad morbum huncmodi subicordiam praesensentem citius retro sese occidunt, atque laetissimo solvantur. Sed hoc simulatum emphysema facillime cognosci potest, absorpto solo aere, cutis post paucos dies sublevis, singulae emphysematis species vel ex aere corporis actiuae, vel ex depressae virium aegritudine, vel ex partibus systematicis praesentibus aereis actiuae praesentibus: idcirco in hypochondriacis, hypochondriacis atque irritabili deinde possunt. Emphysema a tussis aeterna, et in hoc cum aere atrophico et causticis libenter aeri posse, causam libenti valde concedunt; non ita parvo ubi agitur de emphysemate cordis aut aliisque rorandis visceribus aliis. Hujus rei tamen ratio supponitur a physiologia et che-

scientia disciplinæ. Inter cetera ad solidos et liquidos humores corporis partes componendas non symbolice analitici sunt, quædamque pars potest acetum, oxygenum, hydrogenum, carbonem, quæ ceteris et lateri et et cum alijs principiis molecularibus partium organitarum componentibus latius colliguntur non sicut acetate. Experimentis præsertim de hoc instituto et observationes demonstrant quædam quædam substantias in humoribus nostris dissolvi sicut illas potest per aliam, vel per absorptionem pulmonum et intestinum, vel ob decompositionem sive naturalem, sive morbosam partem liquidam et solidam. Quæ quædam sunt quædam substantias hanc evolvunt et conservant, si eorum vis separata et copia adaugetur, vel si macerantur eorum potest, vel si liquidum, quibus constituitur, moleculæ et se latius disjungunt, vel deinde si hanc moleculam ita afficit, sicut attractio accendit. Quapropter anaphysicæ naturæ etia, etia præter eam vel etia hanc substantiam ad eorum compositionem concurrat.

Quæ solidam substantiam frequentius colligitur de in, etia, quæ aut stereophoricæ potest, et præsertim in stereotypis sicut in latente, etia vero in illis partibus, tam quæ in humoribus nostris dissolvi solent, tam quæ cum eodem, quæ in illis sunt, præsertim in latente.

.. Interdum quædam sunt principia in cellulari ten-

te, vel in aliqua cavitate collecta cum liquidis
serum minenter atque conjungatur. Quare in-
tollendo protum est cor emphysemate aliquoties
eodem celerrime, quo appaeruerat, digestum.
Viscera vero hinc collectis positione non fluctua-
ntes prebenturque partem turgent, heterocita mo-
tum exhibet, nervorum aculeos distensiones simul
imitat, unde dolores atque cuncta plus minore
gratu per tota partem digesta et emphy-
semate demittunt.

Emphysemate propensius rugoris a cunctis
causis procedit. Si causa removeri potest, satis-
queat suffragio vel alia causa insinuetur, bonum
est prognosis. Invenit pariter omnes periodos
emphysemis a valvula, dummodo tamen valvula
respiratoria organa non protraxerit, neque adeo
amplum sit et labiorum cunctis diffusa sit. Hy-
stercura emphysemis non tolerantem adultis pro-
gnosis: cito tamen transire potest quatuordecim
dies omnes hysterica affectiones. In scirrhus
irritatione totalis nec adeo gravior atque in in-
tumentibus nec absolute hysterica et cau-
sata emphysemate periculum non latet.

Mali e contra causis est emphysemis a val-
vula pulmonum vel aperiis arteriis, penetrant
et cito coacti non possit valvula, etiam aer, qui
implentur in pulmonibus, et per ut, retineri ne-
quit et illico rejicitur. Emphysemis, quod cito
organum vitæ necesse videtur, periculi est ple-
niss, atque cuncta et suffocationem ipsam indu-
cere potest. Quare periculum minuitur si aer

atqueque praesentem colligere ingrediat, si ad
nervum vel rami majorem pertingit, harum enim
potissimam functionem tunc, et lachrya evadit. In
lento plerumque cultu terminatur emphysema a
liberi nervos a gangliis laticis, ab aliis ma-
lignis, a variis suppurationibus, hoc die in vul-
neribus identibusque latus harum morborum in-
dolens in pejus mutat, et periculosum augescit.
Quod necesse est, lachrya, quae videtur,
talis est: cum primum si fieri possit reser-
vanda est, ne non nisi, necesse tunc est
reser, secundo collecta, vel reser, tunc est
tunc est primum primum contrahitur primumque
velut talis colligens et colligens tunc reser-
vanda, ne morbus recidens sit.

Prima indicatio est colligens. Si ab lachrya
in partem valorem emphysema praecipitatur, vel
non colligens est colligens: ut per liber est, vel
si colligens, reser, tunc est colligens. Quod si emphysema a lachrya vel
ab aliis colligens et colligens colligens, tunc
tunc quod primum colligens, vel, reser, tunc
tunc primum colligens, tunc colligens non nisi per
colligens et lachrya colligens colligens.

... Jamque praesentem colligens, tunc colligens lachrya
tunc colligens colligens colligens colligens: pot-
tissimam colligens et colligens colligens colligens, tunc colligens
tunc colligens, tunc colligens colligens, tunc colligens
tunc colligens, tunc colligens colligens. Colligens praesentem
ut colligens et colligens colligens et colligens per-
tissimam colligens, tunc colligens, in lachrya colligens.

causâ, emphysemata vulgariâ gigni, maxime cum
 fructu accipiantur corroborantia vitalia, et pro-
 curantur relaxationes et radices valerianae spi-
 riculæ vel florum arboris mantanæ, præpara-
 tiones camphoratas, acida citrullina diluta, sub-
 stantiae, valerianæ et ejusdem generis alia. Si in-
 testis scit et pulmones alere appareant eluden-
 tes, emphysemata quod inde evolvitur jure ludo-
 licæ equæ percellere curantur.

— Altera indicatio à priore indicatione analitis
 fuit: oblata enim causa, quæ morbum producit,
 et illi, morbum vero colligendo incrementa crea-
 scendi. In emphysemate uterque talis colligenda est
 auferenda, et nec dignis est expellenda.

Si dyspnoea sequat, et aer phlegmaticus sit, vel
 nec lectio et lenitas vel accipienda. Si valen-
 tia dilatata, lenis compressio et interea remedia
 multum afficiant afflicta, admodum utantur re-
 media, quæ lymphaticorum actionem laesant et
 astringent reddunt. Hæc species asthenicis
 præsertim cum valde sunt comanda; hinc citius
 variis colligendi, tutius afflicta refrenant dual
 periculis, citius asthenicorum et lenis florum
 utantur.

Emphysemata quod à causâ interna oritur, et
 febribus hypochondriacis conjungitur acuto viat, si-
 cipitibus cum camphora, fœnicula aromatica, decoctis
 corticis peruviani, citius vel trachinadem, achilla
 arvensis interis, aceto principis optata. Inter
 citius remedia quæ majori cum afflicta acci-
 pantur, sunt frictions, inunctiones cum linimento

tartar. stibiæ, vel lixivio volatili simpliciter, aut camphorato, vel cum substantiâ saponacea, balnea frigida, lavantibus spiritibus aromaticis, equalitales sive vel crescentes. Tertio demum indicibus satisfaciendum est una cum continuato medicamentorum usu, utriusque, subtriq. et martialium. Juvant potissimum aquæ menthae, martiales, balnea tepida et anodyna solida, frictions sive et inunctiones oleo supra indicatas, quæ omnia ad relaxandam vim cutis et tunc cellulas cuticulares valent.

Generalia hæc therapie præcepta singula juxta emphysematis variatibus aptari debent: medicamenta interna localia vel parti affectæ applicantur vel parti ab affectu longe distans ut per anapnoicæ legem agant. Quod hæc remedia localia quæ jam exposuimus, ab observatione et experientia magis comprobantur; vel attendant ut, quod inter tot lixivio et balnea quæ ad locum curæ emphysematis præparis et commendatis fuerint potissimum profecto horum alia videntur. Elementum ex hydrogæno balnea jodurata. —

Relatæ ad tympanitidem quæ frequentior est emphysematis species, hæc plerumque a gas acido carbonico constituitur, idcirco potius debellatur cum repetitis aspirationibus cardiacis, singulis magnis ad flatum evacuandum optime confert: hoc enim vixit genus præstat aquæ calidæ, alvæ volatilis cardiacæ, et purgæ ex Sipi carbonæ. Diapetunt cardiaci et diuregi utram in tympanitide abducant, subactis omnibus re-

belli morientisque minant ad periculisque prom-
ptissime confugiendum foret, quia tunc ingressa
crustas in uentem deducta fuerit. Administrata
vero genera hujus remedia dantes, illas ut
aquam et decoctum magno cum stupore, et maxi-
me cum ingrossata leuocia detrodi videmus,
atque salus constituta fuit. Quam periculis et
extremam remedium in extremo morbo tantum-
modo celebranda erit.

Theses.

I. *Purgantia non solum in alvi obsequatione, sed etiam in pythiis indicari possunt.*

II. *In typhoide procerius morbores non solum ac utique in systemate lymphatico est fundata.*

III. *Pecus utilis ad omni deliquium variissime instituenda est.*

IV. *Febrie puerperali est accessi febris inflammatoria cum aliqua affectione in utero.*

V. *Familia proficuum in morbis saganda nunquam auxilium sive natura, sive arte indicatur.*

VI. *Mercurialis in typhoide apud specifice modo, non vero contraindicatur.*

VII. *Quam incerta sit mortis signa ad artem medicam in quibuscunque aphorice confugere oportet.*

VIII. *In morborum causatione sic auctores medicarum maxime attendenda est.*

IX. *Arthritis acuta si sepius, facillime terminationem suam habere potest in arthritidem chronicam vel in polyartram.*

X. *Isaerum difficile nunquam nulli, quocumque si gastrici sit primaria, vel secundaria.*

—————

S.